

MEDIDAS Y ACTIVIDADES ADICIONALES ADOPTADAS PARA MANEJO DE CASOS SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, CASOS SOSPITOSOS Y CONFIRMADOS POR COVID 19 EN EL PROCEDIMIENTO 02HH04 DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y SUPLEMENTOS DIETARIOS

Para la distribución de alimentos de pacientes en las áreas de sintomáticos respiratorios, se debe tener en cuenta:

1. Medidas generales de bioseguridad y de cuidados contempla también acciones adicionales de acuerdo a el procedimiento y protocolos para sospechosos ó casos confirmados y el protocolo **03DE03 Medidas Preventivas para el cuidado de la salud de los Funcionarios Personal en formación:**

- Lavado de manos mínimo cada dos horas y cuantas veces sea necesario
- Uso de guantes en todos los casos
- Usar mascarilla o tapabocas durante la permanencia en todas las áreas del HUS
- Uso de cabello recogido dentro del gorro de tela ó desechables
- Se reitera no usar joyas ni accesorios
- No tocar las barandas de las escaleras
- Oprimir los botones de los ascensores con el codo
- No portar el carnet institucional en lugar visible
- Cuidados al retiro de elementos de protección persona, higienizando guantes, descartándolos en caneca roja sin tocar su parte externa, así como las mascarillas quirúrgicas y batas desechables
- Las monogafas deben tener baja de biocarga con detergente enzimático definido por la institución.
- No compartir los elementos de protección personal
- Higienizar los zapatos al ingreso y salida en el sitio dispuesto con solución de hipoclorito al 5% en 5000 Partes por Millón (PPM)
- Evitar reuniones de más de cinco personas y mantener mínimo dos metros de distancia
- Evitar abrazar, dar besos.
- Toser o estornudar protegiéndose con el codo la boca para evitar gotículas.
- Evitar consumir alimentos ni bebidas, en el servicio de alimentación ni en las cocinetas de los servicios asistenciales a fin de evitar gotículas.

- Áreas definidas para atención de pacientes sintomáticos respiratorios:

- Triage inicial en acceso principal
- Carpa en la cancha deportiva
- Consultorio en el área de la cancha deportiva
- Consultorios 7 y 8 de consulta externa
- Servicios de hospitalización 4B y 4 sur (sujeto a expansión por la ocupación de pacientes sintomáticos)

**2. 02DE31-V2 Manejo De Casos probables, confirmados y de contacto por Coronavirus**, que en sus definiciones refiere los elementos de protección personal (EPP), que al igual refiere lo definido en el protocolo **03PH57 Lineamientos para el uso de elementos de protección personal (EPP)**,

**ANEXO DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y SUPLEMENTOS DIETARIOS**

08HH05-V2

durante la atención de los casos probables ó confirmados Coronavirus ó COVID 19, bajo lineamientos adoptados también de la guía del Minsalud y Mintrabajo: **Lineamientos para Prevención Contratos y Reporte de accidente Laboral por r Exposición Laboral por exposición Ocupacional al SAR CoV-2 (COVID 19) en instituciones de salud GPSG04** y donde se define para el personal que distribuye alimentos:

-Personal que NO se encuentra en áreas de sintomáticos respiratorios Hospitalización, Urgencias, Unidades debe usar los elementos de protección personal y realizar las siguientes actividades :

- Usar mascarilla quirúrgica
- Careta de protección
- En el HUS adicionalmente se recomienda uso de monogafas para áreas asistenciales
- El personal de distribución de alimentos de la empresa de aseo alista y entrega los alimentos de acuerdo al procedimiento 02HH04 Distribución de Alimentos a pacientes en los servicios de hospitalización, entregando al acompañante los alimentos y evitar ingresar a la habitación ó cubículo. En caso de que no haya acompañante se deben dejar los alimentos en la mesa del paciente, cuidando el distanciamiento social.

-Distribución de alimentos en área de sintomáticos respiratorios:

- El personal de distribución embala los alimentos en contenedores desechables.
- Al llegar al área, anuncia en el filtro la llegada de los alimentos para los para que el personal de enfermería, reciba los reciba. La alimentación también se da al personal asistencial del servicio.

-Recolección de loza

- Usar guates de látex
- Usar mascarilla quirúrgica
- Careta de protección
- Guantes de caucho para avado de loza
- Los contenedores en las áreas de sintomáticos respiratorios son segregados en bolsa roja en la habitación o cubículo del paciente.
- Al recoger loza que no sea desechable, se debe retirar de los platos y taza los residuos de comida, antes de ingresar a la cocineta respectiva y aplicar solución de hipoclorito al 5% a 5000 PPM
- Lavar la loza de manera habitual usando agua, jabón y desinfectando la loza con solución de WEST (tricloseno sódico 30 al 60%, ácido adípico 10-30%, carbonato de sodio 1-5 %), enjuagando con abundante agua.